

**Carprox**<sup>®</sup>  
CARPROFENO



SUPERANDO  
EL DOLOR

**NUEVO**



El nuevo AINE de Virbac

**Virbac**

## Trastornos musculoesqueléticos, artrosis y enfermedad articular degenerativa en el perro

*Reduce la inflamación y el dolor causados por trastornos musculoesqueléticos y por la enfermedad articular degenerativa*

- Como tratamiento a largo plazo.
- Para mejorar la calidad de vida.
- Ralentiza la progresión de la artrosis y de la enfermedad articular degenerativa.

### Tres concentraciones disponibles



## Control del dolor post-operatorio en perros

*Hasta 5 días como continuación de la analgesia parenteral en el control del dolor post-operatorio*

- Como continuación del tratamiento analgésico en el domicilio.

### Tres concentraciones disponibles



## Superando el dolor con Carprox® e Inflacam®



Inflacam® también está disponible  
en suspensión oral

1,5 mg/ml (15, 42 y 100 ml).



POSOLÓGIA CARPROX




POSOLÓGIA INFLACAM



**CARPROX VET COMPRIMIDOS PARA PERROS** **Composición** Carprofeno 20 mg, 50 mg o 100 mg por comprimido. **Indicaciones** Reducción de la inflamación y el dolor en trastornos musculoesqueléticos y enfermedad articular degenerativa. Control del dolor post-operatorio. **Posología y modo de empleo** Vía oral. 2-4 mg de carprofeno/kg p.v./día repartidas en una o 2 tomas. A los 7 días, reducir según respuesta clínica a 2 mg/kg/día en toma única. Analgésica post-operatoria: 4 mg/kg/día durante 5 días o en función de la respuesta. **Presentaciones** Cajas con 100 comprimidos. **Contraindicaciones** Gatos. Gestantes. Lactantes. Cachorros menores de 4 meses. Hipersensibilidad al producto. Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Úlcera o hemorragia gastrointestinal. Discrasia sanguínea. Perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. **Advertencias y observaciones** Usar con precaución en perros de edad avanzada. En trastornos asociados a infección bacteriana, instaurar el tratamiento antimicrobiano apropiado. En el caso de ingestión consulte con un médico. Lávese las manos después de manipular el producto. No administrar con otros AINEs o glucocorticoides con intervalos menores de 24 h. No usar con fármacos potencialmente nefrotóxicos. No sobrepasar la dosis establecida. Conservar en el envase original a temperatura inferior a 25°C. Eliminar los residuos según normativa vigente. **Reacciones adversas** Vómitos, heces blandas/diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de apetito y letargia. Posibles reacciones adversas idiosincrásicas renales o hepáticas. KRKA, d.d., Novo mesto, Eslovenia. **Nº de Registro** Carprox vet 20 mg comprimidos para perros 2174 ESP. Carprox vet 50 mg comprimidos para perros 2175 ESP. Carprox vet 100 mg comprimidos para perros 2176 ESP. Con prescripción veterinaria.

**INFLACAM** **Composición** Meloxicam. Suspensión oral: 1,5 mg/ml. Comprimidos masticables: 1 y 2,5 mg por comprimido. **Indicaciones** Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en perros. **Posología y modo de empleo** *Tratamiento inicial:* dosis única de 0,2 mg/kg. *Mantenimiento:* 0,1 mg/kg/día. **Presentaciones** Inflacam 1,5 mg/ml: frascos con 15, 42 y 100 ml. Inflacam 1 mg: caja con 100 comprimidos. Inflacam 2,5 mg: caja con 100 comprimidos. **Contraindicaciones** Gestación, lactancia, trastornos gastrointestinales, alteración hepática, cardíaca o renal, trastornos hemorrágicos. Deshidratación, hipovolemia o hipotensión. Hipersensibilidad al producto. Perros menores de 6 semanas y de 4 kg en el caso de los comprimidos. **Observaciones:** No administrar con otros AINEs, glucocorticoides, diuréticos, anticoagulantes ni aminoglucósidos. Infrecuentemente puede producir pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces e insuficiencia renal. En muy raros casos: diarrea hemorrágica, hematemesis, úlceras gastrointestinales y elevación de las enzimas hepáticas. En estos casos se debe interrumpir el tratamiento. Los efectos adversos suelen ser transitorios pero en muy raras ocasiones pueden ser graves o mortales. El pre-tratamiento con antiinflamatorios puede aumentar los efectos adversos. En caso de sobredosificación administrar tratamiento sintomático. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Las personas con hipersensibilidad a los AINES deberán evitar el contacto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico. Eliminar los residuos según las normativas locales. **Titular** Chanelle. **Nº de Registro** Inflacam 1,5 mg/ml suspensión oral para perros 15 ml EU/2/11/134/001, 42 ml EU/2/11/134/002. 100 ml EU/2/11/134/003. Inflacam 1 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/012. Inflacam 2,5 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/014. Con prescripción veterinaria.



## Trastornos musculares y degenerativa en el perro

Reduce la inflamación y por la enfermedad articular

- Como tratamiento a largo plazo
- Para mejorar la calidad de vida
- Ralentiza la progresión de la enfermedad

### Tres concentraciones de comprimidos



Peso corporal	Comprimidos de Carprox® (carprofeno)		
	20 mg	50 mg	100 mg
1-3 kg	½ comprimido		
> 3-6 kg	1 comprimido		
> 6-8 kg	1 comprimido + ½ comprimido		
> 8-10 kg	2 comprimidos		
> 10-14 kg		1 comprimido	
> 14-20 kg		1 comprimido + ½ comprimido	
> 20-25 kg		2 comprimidos	
> 25-30 kg			1 comprimido
> 30-40 kg			1 comprimido + ½ comprimido
> 40-55 kg			2 comprimidos



## degenerativa



## Control del dolor

Hasta 5 días como continuación del dolor post-operatorio

- Como continuación de...

Tres concentraciones de...



Peso corporal	Comprimidos de Carprox® (carprofeno)		
	20 mg	50 mg	100 mg
1-3 kg	½		
> 3-6 kg	1		
> 6-8 kg	1 ½		
> 8-10 kg	2		
> 10-14 kg		1	
> 14-20 kg		1 ½	
> 20-25 kg		2	
> 25-30 kg			1
> 30-40 kg			1 ½
> 40-55 kg			2







Superando el dolor



Inflacam® también es  
en suspensión oral

1,5 mg/ml (15, 42 y 100 mg)

Peso corporal	Comprimidos de Carprox® (carprofeno)		
	20 mg	50 mg	100 mg
1-3 kg	½		
> 3-6 kg	1		
> 6-8 kg	1 ½		
> 8-10 kg	2		
> 10-14 kg		1	
> 14-20 kg		1 ½	
> 20-25 kg		2	
> 25-30 kg			1
> 30-40 kg			1 ½
> 40-55 kg			2



POSOLÓGIA CARPROX

POSOLÓGIA INFLACAM

## Superando el dolor



Carprox 20 mg  
100 comprimidos



Inflacam<sup>®</sup> también es  
en suspensión oral

1,5 mg/ml (15, 42 y 105 días)

Peso corporal	Comprimidos de Inflacam <sup>®</sup> (meloxicam)	
	1 mg	2,5 mg
> 4-7 kg	◐	
> 7-10 kg	●	
> 10-15 kg	◐ ◐	
> 15-20 kg	● ●	
> 20-25 kg		●
> 25-35 kg		◐ ◐
> 35-50 kg		● ●



Carprox 100 mg  
100 comprimidos



POSOLÓGIA CARPROX



POSOLÓGIA INFLACAM

