

Cyclavance®



Descubre al dermatólogo que llevas dentro

# FELICIDAD LIQUIDA

**Cyclavance®**, ciclosporina  
en solución líquida.

Ahora más perros atópicos podrán  
recibir el tratamiento que se merecen.



Virbac



# LOS PERROS ATÓPICOS SERÁN MÁS FELICES

gracias a CYCLAVANCE®

Felicidad por su **fiabilidad**

CYCLAVANCE® la conocida **eficacia de la ciclosporina**, ahora en **forma líquida**

- Bloquea la liberación de citoquinas inflamatorias<sup>1</sup>
- Potente efecto antiinflamatorio y antipruriginoso<sup>2</sup>

Tiempo de muestreo (h)	Concentración media de ciclosporina en la sangre del perro (ng/ml) <sup>3</sup>	
	Líquido 	Capsulas 
1	713	697
6	159	158
24	31	31

La ciclosporina **líquida** es **equivalente** a la ciclosporina en **cápsulas**.

La ciclosporina está recomendada por el Grupo Internacional sobre Dermatitis Atópica Canina para el tratamiento de perros atópicos<sup>4</sup>

- Alivia significativamente el prurito y reduce las lesiones cutáneas en tan solo 4 semanas ( $p < 0,001$ )<sup>5</sup>
- Mantiene efectos beneficiosos a largo plazo con una dosificación a días alternos o dos veces por semana<sup>2</sup>



# ÓPTICOS ICES QUE NUNCA

Felicidad por disponer de **una solución inteligente.**

CYCLAVANCE® es una **nueva formulación líquida** de ciclosporina que reduce el sufrimiento de los perros con dermatitis atópica.

- Dosificación precisa para optimizar la eficacia y la seguridad
- **Fácil de administrar y muy bien aceptada** por los perros<sup>3</sup>
- Sin aditivos saborizantes
- Exclusivo para veterinarios, para un máximo control del tratamiento
- Asequible, para que más perros puedan acceder al tratamiento
- De Virbac, expertos en dermatología

Trata a más perros atópicos con CYCLAVANCE®,  
**una elección inteligente** que hará su vida más feliz que nunca.



# ÓPTICOS ICES QUE NUNCA

## Felicidad por su **precisión** y **control**

Al ser una fórmula líquida, CYCLAVANCE® es una elección inteligente que permite una dosificación más precisa que las cápsulas de ciclosporina.

- Limita los efectos adversos de la sobredosificación
- Evita la ineficacia por dosificación insuficiente
- Facilita el control del tratamiento

Cyclavance® optimiza  
la **eficacia** y la **seguridad**.

## Felicidad por su **sencillez**


CYCLAVANCE® favorece el cumplimiento al ofrecer a tus clientes una forma sencilla de administrar la medicación. Los propietarios solo tienen que dispensarla en la boca de su perro.

Es más fácil  
**tratar a más perros.**



## Felicidad por la **aceptación demostrada**

La aceptación de CYCLAVANCE<sup>®</sup> es significativamente superior a la de las cápsulas de ciclosporina ( $p < 0,001$ )<sup>3</sup>



Los productos se administraron en boca a dosis de 5 mg/kg durante 10 días, 2 horas antes de la comida.

CYCLAVANCE<sup>®</sup> no contiene aditivos saborizantes.

## Felicidad por tener un socio en quien confiar

CYCLAVANCE<sup>®</sup> está fabricado por Virbac

- Pioneros en dermatología veterinaria
- Orgullosos de ofrecer una amplia gama de productos para la salud de la piel de los animales de compañía




Virbac, un aliado para los veterinarios desde **hace más de 40 años**

# HAZLE MÁS FELIZ

con una opción flexible de ciclosporina.

Ajusta las dosis para satisfacer las necesidades de más perros atópicos, sin que importe su tamaño.\*

Peso del paciente	Dosis diaria inicial **	Tamaño del vial	Tamaño de la jeringa	Duración del frasco
 3 kg	0,15 ml	5 ml	1 ml graduada cada 0,05 ml	33 días
 10 kg	0,5 ml	15 ml	1 ml graduada cada 0,05 ml	30 días
 20 kg	1 ml	30 ml	3 ml graduada cada 0,1 ml	30 días
 40 kg	2 ml	50 ml	3 ml graduada cada 0,1 ml	25 días

\* No utilizar en perros de menos de 6 meses de edad o con un peso corporal inferior a 2 kg.

\*\* Dosis diaria inicial de 5 mg/kg.

VP900728

**BIBLIOGRAFÍA** 1. Mascarell L, Truffa-Bachi P. New aspects of cyclosporin a mode of action: from gene silencing to gene up-regulation. *Mini Rev Med Chem* 2003; 3(3):205-214. 2. Steffan J, Favrot C, Mueller R. A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of cyclosporin for the treatment of atopic dermatitis in dogs. *Vet Dermatol* 2006; 17(1):3-16. 3. Data on file, Virbac S.A. 4. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. *Vet Dermatol* 2010; 21(3):233-248. 5. Steffan J, Parks C, Seewald W, and North American Veterinary Dermatology Cyclosporine Study Group. *Clinical trial evaluating the efficacy and safety of cyclosporine in dogs with atopic dermatitis*. *J Am Vet Med Assoc* 2005; 226(11):1855-1863.

**CYCLAVANCE 100 mg/ml solución oral para perros.** Ciclosporina 100 mg/ml. **Indicaciones:** dermatitis atópica canina. **Posología y modo de empleo:** 5 mg/kg p.v. vía oral al menos 2 h antes o después de las comidas. Administrar diariamente hasta mejoría clínica para posteriormente ajustar frecuencia (cada 2, 3 o 4 días) y duración del tratamiento según respuesta. Si no hay mejoría en 8 semanas, parar el tratamiento. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al producto. Menores de 6 meses o 2 kg. Desórdenes malignos. Diabetes. Lactantes. **Interacciones:** Compuestos del grupo de azoles (p.e el ketoconazol) y macrólidos como eritromicina aumentan la concentración de ciclosporina en sangre. Determinados inductores del citocromo P450, antiepilépticos y antibióticos (p.e. trimetoprim /sulfadimidina) pueden reducir la concentración plasmática. La ciclosporina es un sustrato y un inhibidor del transportador de P-glicoproteína MDR1: la administración simultánea con lactonas macrocíclicas (p. e. la ivermectina y la milbemicina) podría causar toxicidad del SNC. Puede incrementar la nefrotoxicidad de los antibióticos aminoglicósidos y del trimetoprim. No combinar con inmunosupresores. No vacunar durante el tratamiento ni 2 semanas antes o después. **Observaciones:** Realizar un examen completo antes del tratamiento. Descartar y/o eliminar las infecciones previas. Tratar las pulgas. La ciclosporina reduce la respuesta antitumoral y afecta a los niveles de insulina. En animales de laboratorio a dosis altas es embriotóxica y fetotóxica: en reproductores y gestantes valorar riesgo/beneficio. Con enfermedad renal, monitorizar creatinina. No combinar con inmunosupresores. Lavarse las manos tras el uso. Puede producir salivación, vómitos, diarreas, letargo, hiperactividad, anorexia, hiperplasia gingival, lesiones verruciformes o cambios en el pelaje, enrojecimiento e hinchazón del pabellón auricular, debilidad o calambres musculares y salivación. En muy raros casos, diabetes mellitus, especialmente en West Highland. Evitar el contacto en caso de hipersensibilidad. En caso de contacto, lave la zona con agua. En caso de ingestión, consulte al médico. **Presentaciones:** Frasco de 5, 15, 30 o 50 ml con tapón dispensador y jeringa graduada. Con prescripción veterinaria. N° de registro 3011 ESP

Servicio de atención profesional  
Tel. 902 090 667 - 933 716 373

[infocliente@virbac.es](mailto:infocliente@virbac.es)

Virbac España S.A.

Àngel Guimera, 179-181

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

[www.virbac.es](http://www.virbac.es)

Construyendo el futuro de la salud animal

**Virbac**